

LÍNGUA PORTUGUESA**Texto para as questões de 1 a 10.**

1 O pesquisador britânico e professor de neurociência e psicologia Matthew Walker apresentou em Vancouver, no Canadá, em 18/4/2019, o resultado de uma série de pesquisas que ligam a privação do sono a inúmeros problemas de saúde, entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração.

7 O pesquisador diz que é hora de reivindicar o direito de dormir direito sem sentir vergonha ou ser chamado de preguiçoso. “É uma epidemia silenciosa que está se tornando rapidamente um dos maiores problemas de saúde pública do século 21”.

13 Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver, homens que dormem apenas cinco horas por noite têm os testículos significativamente menores que os que dormem sete horas ou mais. E aqueles que dormem com frequência apenas quatro ou cinco horas apresentam nível de testosterona que se equipara ao de homens dez anos mais velhos.

19 Fundador e criador do Centro de Ciência do Sono Humano em Berkeley, Walker disse também que há problemas no sistema reprodutivo feminino. Além disso, dormir seis horas ou menos por noite afeta o cérebro e suas funções de memória e aprendizado e diminui em 70% as células do sistema imunológico.

25 “Nos últimos dez anos, aprendemos que a pessoa precisa dormir depois de aprender para não esquecer as memórias e também antes de aprender para preparar o cérebro, que pode ser comparado a uma esponja seca prestes a ficar molhada de conhecimento. Caso a pessoa fique sem dormir, o circuito da memória no cérebro fica molhado o tempo todo e não consegue absorver nada novo”, afirmou o professor.

34 Walker explicou que ondas cerebrais “grandes e poderosas” se formam durante os estágios de sono profundo. “Funcionam como uma transferência de arquivos, de um reservatório vulnerável de memória curta para um armazenamento mais permanente no cérebro para protegê-la”, explicou.

40 A descoberta trouxe evidências em 2018 de que a piora no sono que experimentamos quando envelhecemos pode estar contribuindo para a falta de memória e até mesmo para o surgimento do Alzheimer.

43 Seu centro de pesquisa está desenvolvendo técnicas para melhorar o sono profundo e as soluções não estão nas pílulas para dormir.

46 O cientista mostrou também como dormir mal afeta até mesmo os genes. Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de pouco sono. A atividade de metade deles aumentou e a outra diminuiu. Os genes cuja atividade diminuiu estavam associados ao sistema imunológico e os genes cuja atividade aumentou estavam ligados a inflamações, tumores e estresse.

55 Segundo Walker, dormir não pode ser considerado um item de luxo porque é uma necessidade biológica inegociável. “Depreciar o ato de dormir nas nações industrializadas está tendo um impacto catastrófico na saúde e na educação e segurança das crianças”, considera o pesquisador.

QUESTÃO 1

O texto caracteriza-se como

- (A) descritivo, visto que nele predominam descrições de comportamentos humanos associados a inúmeros problemas de saúde.
- (B) dissertativo-argumentativo, no qual se defende a ideia de que problemas de memória podem ser curados por meio de terapias de sono profundo.
- (C) dissertativo-expositivo, porque nele se expõem as causas da privação de sono nas nações industrializadas.
- (D) dissertativo-informativo, visto que seu objetivo central é informar o público leitor dos prejuízos causados à saúde pela privação do sono.
- (E) narrativo, dada a presença de discurso direto e de fatos cronológicos que exemplificam os achados de uma pesquisa científica.

QUESTÃO 2

Conclui-se da leitura do texto que

- (A) a privação do sono é uma das causas do envelhecimento precoce.
- (B) pessoas que dormem mais de seis horas por noite não desenvolvem mal de Alzheimer.
- (C) dormir sete horas ou mais por noite é importante para a saúde humana.
- (D) as pílulas para dormir são ineficazes para se atingir o estágio de sono profundo.
- (E) as nações industrializadas desconsideram a educação e a saúde das crianças.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos do texto.

- (A) Os vocábulos “têm” e “além” são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.
- (B) Os vocábulos “piora” (linha 40) e “falta” (linha 41) são empregados no texto como verbos.
- (C) Na oração “entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração” (linhas 5 e 6), a partícula “se” indica que o sujeito é indeterminado.
- (D) Na linha 46, o vocábulo “como” introduz uma oração comparativa.
- (E) Na oração “considera o pesquisador” (linhas 58 e 59), o sujeito está posposto ao verbo.

QUESTÃO 4

Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso se substituísse

- (A) “que se equipara” (linha 17) por **equiparando**.
- (B) “há” (linha 20) por **existem**.
- (C) “Nos últimos dez anos” (linha 25) por **Fazem dez anos**.
- (D) “Caso” (linha 29) por **Se**.
- (E) “cuja” (linha 50) por **em que a**.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentados substituem, respectivamente, com correção e de acordo com as ideias do texto, as formas verbais “reivindicar” (linha 7) e “Depreciar” (linha 56).

- (A) exigir / Menosprezar
- (B) requizar / Dizimar
- (C) solicitar / Ezaurir
- (D) retomar / Expiar
- (E) insistir / Recusar

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que está correta a identificação da circunstância expressa pela oração destacada do texto.

- (A) “Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver” (linhas 12 e 13) – tempo
- (B) “depois de aprender” (linha 26) – conformidade
- (C) “para não esquecer as memórias” (linhas 26 e 27) – finalidade
- (D) “Caso a pessoa fique sem dormir” (linhas 29 e 30) – modo
- (E) “porque é uma necessidade biológica inegociável” (linhas 55 e 56) – consequência

QUESTÃO 7

No que diz respeito à pontuação, estariam preservadas a correção gramatical e a coerência do texto caso fosse

- (A) inserida uma vírgula imediatamente após o termo “Walker” (linha 2).
- (B) inserido ponto final imediatamente após o vocábulo “menores” (linha 14), feito o devido ajuste de minúscula para maiúscula na letra inicial da palavra que inicia o novo período.
- (C) suprimida a vírgula empregada após o vocábulo “cérebro” (linha 28).
- (D) inserido o sinal de dois pontos imediatamente após a forma verbal “explicou” (linha 33).
- (E) inserida uma vírgula imediatamente após o termo “profundo” (linha 44).

QUESTÃO 8

Considerando os mecanismos de coesão no texto, assinale a alternativa em que há correta correspondência entre o termo ou a expressão destacados e o respectivo elemento de referência.

- (A) “os quais” (linha 5) – “tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração” (linhas 5 e 6)
- (B) “os”, em “os que dormem” (linhas 14 e 15) – “homens” (linha 13)
- (C) “-la”, em “protegê-la” (linha 38) – “transferência de arquivos” (linhas 35 e 36)
- (D) “Seu” (linha 43) – “Alzheimer” (linha 42)
- (E) “deles” (linha 49) – “adultos saudáveis” (linha 47)

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente correta e coerente para o seguinte trecho do texto: “Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de pouco sono.” (linhas de 47 a 49).

- (A) **Em estudo com adultos saudáveis, observou as atividades dos genes onde foram distorcidas consequentemente de pouco sono.**
- (B) **Um estudo com adultos saudáveis, mostrou que as atividades dos genes sendo distorcidas em decorrência de pouco sono.**
- (C) **Um estudo com adultos saudáveis distorceu às atividades dos genes em decorrência de pouco sono.**
- (D) **Em um estudo com adultos saudáveis, observou-se, como consequência de pouco sono, uma distorção nas atividades dos genes.**
- (E) **Um estudo realizado com adultos saudáveis, as atividades dos genes distorceram face à pouco sono.**

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta no que se refere à correção gramatical e à adequação da linguagem do trecho apresentado à correspondência oficial.

- (A) Informamos-lhe que sua solicitação foi encaminhada à Direção de Pessoal desta Fundação para análise e pronunciamento.
- (B) Informo-lo que a reunião marcada com a Direção-Geral para 4/6/2019 foi transferida para 18/6/2019 as 15 horas.
- (C) Informo-o de que, passado cinco meses da publicação do resultado da avaliação de desempenho, não será possível pedir revisão da mesma.
- (D) Solicitamos que alguém dessa Gerência esteja presente na audiência pública sobre atenção a saúde à ser realizada em 6/7/2019, na Câmara de Vereadores.
- (E) Esclarecemos que não tem possibilidade de prorrogação do prazo estipulado para as inscrições no programa de incentivo funcional desta Fundação.

LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é(são) princípio(s) fundamental(is) da República brasileira

- (A) a soberania e a garantia do desenvolvimento nacional.
- (B) o respeito aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- (C) a redução da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.
- (D) não ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- (E) o respeito à privacidade, à intimidade e à inviolabilidade da pessoa humana.

QUESTÃO 12

Conforme a CF, não pode ser gratuito(a) o(a)

- (A) *habeas data*.
- (B) *habeas corpus*.
- (C) certidão de óbito.
- (D) mandado de segurança.
- (E) registro civil de nascimento.

QUESTÃO 13

Segundo a CF, é direito dos trabalhadores rurais e urbanos o(a)

- (A) remuneração do trabalho noturno majorada em dobro em relação à do diurno.
- (B) remuneração do serviço extraordinário superior, no máximo, em 50% à do normal.
- (C) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.
- (D) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um quarto a mais que o salário normal do período.
- (E) adicional de um terço na remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

QUESTÃO 14

O Estatuto do Idoso estabelece que é

- (A) permitida a cobrança de valores diferenciados pelos planos de saúde em razão da idade da pessoa.
- (B) vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese em que se admite o contato em sua residência ou por procurador, conforme o caso.
- (C) obrigatório o comparecimento pessoal do idoso enfermo junto ao posto de perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), especificamente para expedição do laudo de saúde necessário à isenção tributária.
- (D) facultativo ao idoso internado o direito à acompanhante, cabendo ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificar por escrito a autorização e a necessidade.
- (E) garantido o fornecimento, a preços menores, de medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como de próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação.

QUESTÃO 15

As entidades governamentais de atendimento ao idoso que descumprirem as determinações do Estatuto ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, à(s) seguinte(s) penalidade(s):

- (A) multa.
- (B) interdição de unidade e suspensão de programa.
- (C) afastamento provisório ou definitivo de seus dirigentes.
- (D) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas.
- (E) proibição de atendimento a idosos, a bem do interesse público.

QUESTÃO 16

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta.

- (A) O atendimento pré e pós-natal será realizado por profissionais da atenção terciária.
- (B) Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, de ambos os pais ou responsáveis.
- (C) É recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente sejam encaminhados à Vara da Infância e da Juventude.
- (D) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último mês da gestação, ao estabelecimento mais próximo de sua residência para realização do parto.
- (E) Incumbe ao Poder Público proporcionar, no período pré e pós-natal, assistência psicológica à gestante e à mãe, inclusive as que desejam entregar os filhos para adoção e as que se encontrem presas.

QUESTÃO 17

Compete ao conselho fiscal da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas

- (A) manifestar-se sobre os relatórios exarados pela diretoria executiva.
- (B) apreciar, alterar e aprovar o plano anual de atividades apresentado pela diretoria executiva.
- (C) apreciar e aprovar, até o dia 30 de abril de cada ano, o balanço financeiro, o relatório anual e as demais contas do exercício, apresentados pela diretoria executiva.
- (D) aprovar projetos de construção ou reforma em bens imóveis de propriedade da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, respeitadas as cautelas legais.
- (E) deliberar acerca de auxílios, doações, legados, dotações ou outras subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem encargos.

QUESTÃO 18

À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta em relação à adoção.

- (A) Não pode ser feita por procuração.
- (B) Admite revogação, desde que justificada junto ao juízo.
- (C) Na falta dos pais, os avós e os irmãos do adotando poderão adotá-lo.
- (D) Toda pessoa, independentemente da idade, pode ser legalmente adotada.
- (E) Podem adotar os maiores de dezesseis anos de idade emancipados, independentemente do estado civil.

QUESTÃO 19

O conselho curador da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas será composto por vários representantes, dentre eles:

- (A) três representantes dos empregados do quadro permanente da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas.
- (B) um membro, dentre usuários da comunidade, eleito em audiência pública convocada pelo Conselho Municipal de Saúde.
- (C) um membro indicado pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área de gestão hospitalar.
- (D) três membros indicados pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área orçamentária e financeira.
- (E) um representante da Secretaria Municipal de Gestão Pública, indicado pelo prefeito municipal.

QUESTÃO 20

De acordo com a CF, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único, que tem como uma de suas diretrizes o(a)

- (A) centralização da direção em uma esfera, no caso o governo federal.
- (B) rede regionalizada e sem hierarquia ou precedência.
- (C) atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais.
- (D) participação da comunidade.
- (E) atendimento integral, com prioridade para as atividades emergenciais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

A maior parte da língua é composta por tecido muscular, sendo que alguns dos músculos estão alojados completamente dentro da língua (intrínsecos) e outros se originam em estruturas anatômicas fora da língua, mas se ligam a alguma parte dela (extrínsecos). Os músculos intrínsecos são: longitudinal inferior; longitudinal superior; transversos; e vertical. Os músculos extrínsecos são responsáveis pela postura bruta da língua e incluem o genioglosso, o estiloglosso, o hioglosso e o palatoglosso. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) O músculo vertical trabalha principalmente para abaixar e levantar a ponta da língua.
- (B) O músculo estiloglosso auxilia na elevação da parte posterior da língua.
- (C) No músculo genioglosso, as fibras posteriores auxiliam na protrusão da ponta da língua e no relaxamento das margens laterais e as fibras anteriores retraem a língua. A contração de todo o músculo abaixa a porção medial da língua.
- (D) O músculo hioglosso auxilia na retração da língua, puxando-a na direção da faringe para realizar a deglutição.
- (E) O músculo palatoglosso auxilia na retração da língua e abaixa as laterais da língua.

QUESTÃO 22

O véu palatino é o articulador secundário na produção dos sons consonantais velares (/k/ e /g/) que auxilia na regulação da ressonância oral/nasal. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A hipernasalidade é uma quantidade diminuída da ressonância nasal perceptível durante a fonação.
- (B) Disfunção velofaríngea (DVF) e insuficiência velofaríngea (IVF) são termos utilizados para descrever o fenômeno que pode ser gerado pela movimentação anormal do mecanismo velofaríngeo, por insuficiência do tecido ou por ambas.
- (C) As características da DVF são as emissões orais impróprias, a pressão oral e a ressonância nasal aumentada durante a fala.
- (D) A hipernasalidade é resultado típico de obstrução anatômica, que inclui hipertrofia de adenoides/tonsilas palatinas, hipertrofia de conchas nasais e rinite alérgica, entre outros.
- (E) Quando a porta velofaríngea está aberta, um pouco do tom de voz é desviado para a cavidade oral, para ressoar ali, enquanto o restante (maioria) ressoa na cavidade nasal. Para que a porta velofaríngea esteja aberta e a ressonância nasal possa ocorrer para o /m/ ou o /n/, o palato mole deve estar elevado.

QUESTÃO 23

O processo de aquisição de uma língua ocorre de forma espontânea na presença de um ambiente linguístico composto por diferentes falantes e diferentes contextos. Por meio da experiência social com usuários de uma língua, a criança desenvolve a fluência verbal. Com relação ao desenvolvimento de linguagem nos primeiros anos de vida, assinale a alternativa correta.

- (A) Por volta dos três meses de vida, o bebê emite sons guturais ou bilabiais (/k/, /g/, /p/ e /b/). Esses sons são produzidos com intenção comunicativa, para chamar a atenção do adulto.
- (B) Até aproximadamente o quinto mês de vida, o bebê realiza emissões vocais com intenção comunicativa, denominadas balbúcio fisiológico.
- (C) Os bebês surdos não apresentam, em nenhuma fase de seu desenvolvimento, o ato reflexo de vocalizações, devido à sua condição de perda sensorial.
- (D) No transcorrer do primeiro ano de vida do bebê, o sistema fonológico é considerado como linguístico e se caracteriza apenas por sons existentes na língua presente.
- (E) Na faixa entre doze e dezoito meses de vida, há um rápido aumento na compreensão e na fala. O vocabulário da criança se amplia principalmente com relação a nomes de pessoas e de objetos que fazem parte de sua rotina.

QUESTÃO 24

Uma paciente de 57 anos de idade, fumante desde os vinte, compareceu ao consultório com a queixa de voz rouca, com tom grave, e dificuldade para respirar.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que se trata de uma alteração vocal ocasionada por

- (A) nódulo vocal.
- (B) granuloma.
- (C) edema de Reinke.
- (D) úlcera de contato.
- (E) pólipos vocais.

QUESTÃO 25

A Portaria n.º 19/1998 forneceu subsídios para a definição e classificação da PAIR, assim como das diretrizes e padronizações para a realização dos exames audiométricos. De acordo com essa Portaria, o exame audiométrico deverá ser realizado em cabina audiométrica cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os níveis máximos permitidos (ISO 8253.1). Sendo assim, assinale a alternativa correta no que se refere à fonoaudiologia na saúde do trabalhador.

- (A) Para a realização do exame audiométrico, o trabalhador deverá permanecer em repouso acústico por um período mínimo de seis horas.
- (B) É considerada como um desencadeamento a progressão da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados quando há uma piora nos limiares auditivos de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz, em pelo menos uma das frequências, maior ou igual a 15 dB.
- (C) São considerados como sugestivos de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados os casos cujos audiogramas, nas frequências de 1.000 e(ou) 2.000 e(ou) 3.000 Hz, apresentam limiares auditivos acima de 25 dB(NA) e mais elevados que nas outras frequências testadas, estando estas comprometidas ou não, tanto no teste da via aérea quanto no da via óssea, em um ou em ambos os lados.
- (D) A primeira audiometria realizada na empresa será denominada de audiometria de referência. Ela servirá de base para a comparação do exame sequencial, que deverá ser realizado após um ano de trabalho. As audiometrias sequenciais seguintes deverão ser sempre comparadas com a última realizada, e não com a referencial.
- (E) Entende-se por perda auditiva por níveis de pressão sonora elevados as alterações dos limiares auditivos, do tipo sensorioneural, decorrentes da exposição ocupacional sistemática a níveis de pressão sonora elevados. Tem como características principais a progressão gradual com o tempo de exposição ao risco e a reversibilidade, isto é, uma vez encerrada a exposição, os limiares auditivos tendem a retornar para a normalidade.

QUESTÃO 26

O transtorno do espectro autista (TEA) é um diagnóstico prevalente no contexto infantojuvenil. Dados recentes mostram que atinge 3% da população, isto é, uma a cada cem crianças, segundo o NICE (*National Institute for Health and Care Excellence*). A respeito desse transtorno, assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria das crianças e dos indivíduos diagnosticados com autismo apresentam alterações cromossômicas, com genes preferentemente envolvidos e histórico de intercorrências gestacionais.
- (B) O TEA é de fácil diagnóstico, pois é caracterizado como um transtorno que apresenta *deficits* clinicamente temporários na comunicação e nas interações sociais.
- (C) A sintomatologia manifesta-se desde os primeiros anos de vida, entretanto o diagnóstico só pode ser concluído com seis anos de idade. Ocorre quatro vezes mais no sexo feminino que no sexo masculino.
- (D) Entre as manifestações mais frequentes de TEA estão: *deficits* expressivos na comunicação não verbal e verbal; falta de reciprocidade social; incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade apropriados para o estágio de desenvolvimento; e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades.
- (E) O fenótipo do TEA é homogêneo e apresenta uma etiologia unifatorial. Trata-se de um transtorno emocional que tem sido relacionado com a hereditariedade. Há um indicativo de risco de recorrência de autismo entre gêmeos monozigóticos superior a 90% quando se considera o amplo espectro de manifestações.

QUESTÃO 27

A doença de Parkinson (DP) é decorrente de uma degeneração de neurônios localizados na substância negra do mesencéfalo. Essa degeneração tem como consequência a liberação do neurotransmissor dopamina na região do corpo estriado. Mesmo sem tratamento curativo, é uma das doenças neurológicas crônicas com um dos melhores índices de sucesso. Acerca da DP, assinale a alternativa correta.

- (A) A articulação imprecisa é a característica perceptual mais frequentemente encontrada na fala parkinsoniana, sendo responsável pela fala ininteligível.
- (B) O achado mais frequentemente observado na avaliação perceptivo-auditiva da voz de pacientes com DP é a qualidade vocal inalterada, caracterizada por voz hipofônica, sem alteração na melodia, porém soprosa e eventualmente trêmula.
- (C) Pacientes com DP normalmente apresentam tempo máximo de fonação (TMF) aumentado e hiperfunção do mecanismo fonoarticulatório.
- (D) Os pacientes com DP apresentam dificuldades de deglutição apenas na fase faríngea, devido ao atraso no reflexo de deglutição. Apesar do tremor nos órgãos fonoarticulatórios, não há prejuízo para a formação inicial do bolo alimentar nem limitação da excursão da língua e da mandíbula durante a mastigação.
- (E) O aumento da intensidade vocal é um dos primeiros sintomas a aparecer. Apesar da rigidez, mesmo em estágios mais avançados, não há prejuízo na modulação normal da fala (frequência e intensidade).

QUESTÃO 28

Segundo o ABFW (teste de linguagem infantil nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e pragmática), a fluência, por definição, refere-se ao fluxo contínuo e suave de produção de fala. O falante fluente é aquele que pode produzir longas sequências de sílabas sem esforço, combinando emissões rápidas e contínuas com uma emissão que seja reflexo próximo de sua intenção, ou seja, de sua habilidade e maturidade linguística. Para a avaliação da fluência, devem ser levados em consideração alguns critérios, como a tipologia das rupturas. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) A repetição de frases consiste na repetição de pelo menos duas palavras completas na mensagem (por exemplo: eu cheguei, eu cheguei atrasado).
- (B) As pausas correspondem ao tempo inapropriado para se iniciar um fonema ou a liberação de uma posição articulatória fixa (manter a boca aberta antes de se iniciar a emissão).
- (C) A interjeição ocorre quando uma palavra não é terminada (por exemplo: eu fui na pra).
- (D) A repetição de sílabas é a repetição de um fonema que compõe a palavra (por exemplo: você vai s s s sair).
- (E) A hesitação consiste na pausa curta em que o falante parece estar procurando a palavra, no prolongamento de vogais usuais, e também é chamada de pausa silenciosa (por exemplo: é..., ã..., hum...).

QUESTÃO 29

Uma paciente de oito anos de idade compareceu à clínica de fonoaudiologia para realização de avaliação audiológica. De acordo com a mãe, a menor irá iniciar acompanhamento fonoaudiológico devido a trocas na escrita. A paciente deverá realizar exames audiológicos.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

- (A) A timpanometria é um exame fundamental para a avaliação da paciente, pois se trata de um procedimento eletroacústico que contribui para a identificação das alterações de orelha interna.
- (B) O teste do limiar de reconhecimento de fala (LRF) irá identificar a maior intensidade que a paciente será capaz de reconhecer em 50% dos estímulos de fala.
- (C) O teste do índice de reconhecimento de fala (IPRF) deverá ser realizado com 25 palavras monossilábicas, sendo que cada item correto irá corresponder a 4% de reconhecimento de fala. Para sua execução de rotina, utiliza-se a média tritonal dos limiares de via óssea + 40 dB. Essa intensidade pode ser variável, especialmente em pacientes com perdas condutivas que, com frequência, consideram a intensidade padrão como muito forte.
- (D) Mesmo com limiares dentro da normalidade, devido à dificuldade apresentada na escrita, deverá ser realizado o teste de limiar de detecção de voz (LDV).
- (E) Para análise quanto ao grau da perda auditiva nessa faixa etária, deverá ser utilizada a classificação de adulto, visto que, de acordo com o guia de orientações na avaliação audiológica básica, elaborado pelo Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia (2017), a classificação infantil sugerida, de Northern e Downs, deve ser utilizada apenas até os sete anos de idade.

QUESTÃO 30

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2005, 278 milhões de pessoas tiveram perdas auditivas de grau moderado a profundo, sendo que 80% destas vivem em países em desenvolvimento. A metade dos casos de deficiência auditiva poderia ser prevenida e seus efeitos minimizados se a intervenção tivesse sido iniciada precocemente. Segundo dados de diferentes estudos epidemiológicos, a prevalência da deficiência auditiva varia de um a seis neonatos para cada mil nascidos vivos e de um a quatro para cada cem recém-nascidos provenientes de unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN). Acerca da triagem auditiva neonatal, assinale a alternativa correta.

- (A) A permanência na UTI, mesmo que por apenas um dia, já caracteriza indicador de risco para a deficiência auditiva (IRDA).
- (B) Casos de consanguinidade são considerados como indicadores de risco e o exame indicado para realização da triagem é apenas a emissão otoacústica. Esse exame é fundamental, uma vez que casos de consanguinidade apresentam incidência alta de alterações retrococleares.
- (C) Conforme as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal, a triagem auditiva deve ser realizada antes de o recém-nascido completar 24 h ou, no máximo, durante a primeira semana de vida.
- (D) No caso de resposta insatisfatória (falha), deverá ser marcado um retorno. Caso a falha persista, deve-se realizar o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE automático ou em modo triagem).
- (E) O registro do PEATE é recomendado na realização da triagem auditiva em crianças sem IRDA, pois se trata de um teste rápido, simples, com alta sensibilidade, capaz de identificar perdas cocleares em torno de 30 a 35 dB.

QUESTÃO 31

Pós Calórica - AR 50°C e AR 24°C-Rec.1			
VACL Média	I	I OA	I.Fix.
• Quente Esquerdo	5	NA	NA
• Quente Direito	-9	NA	NA
• Fria Esquerdo	-9	NA	NA
• Fria Direito	10	NA	NA
• Gelada Esquerdo	NA	NA	NA
• Gelada Direito	NA	NA	NA
P.D C1	9,00% Para Direita		
P.L C1	15,00% Para Direita		

A vectoeletronistagmografia consiste em um método para o registro eletrônístagmográfico que permite a gravação dos movimentos horizontais, verticais e oblíquos, além de determinar a velocidade angular real da componente lenta do nistagmo. Considerando essa informação e a ausência de qualquer sinal central em qualquer uma das provas realizadas, assinale alternativa que apresenta a conclusão para a avaliação mostrada no quadro acima.

- (A) sugestivo de hiperreflexia
- (B) sugestivo de hiporreflexia
- (C) sugestivo de disfunção vestibular deficitária à direita
- (D) sugestivo de disfunção vestibular
- (E) dentro da normalidade

QUESTÃO 32

As fissuras labiopalatinas (FLP) são malformações congênitas de lábio e palato, consideradas como craniofaciais e enquadradas na classificação de displasias (Cardim, 1989). Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) No caso de uma fissura pós-forame completa, a cirurgia, denominada queiloplastia, deverá ser realizada por volta dos três meses de vida.
- (B) A fissura submucosa oculta é facilmente identificável, pois os lábios estarão acometidos.
- (C) O tratamento não deve ser exclusivamente cirúrgico, mas sim interdisciplinar, com uma equipe formada por diversos profissionais, entre eles, o geneticista. No aconselhamento genético, será oferecida à família a opção de gerar ou não mais filhos, mediante o conhecimento do risco de que a patologia se repita.
- (D) O aleitamento materno não é indicado, visto que, devido à malformação nos lábios e(ou) no palato, o recém-nascido terá dificuldade de manter o vedamento. Dessa forma, deverá ser indicado o uso da sonda nasogástrica.
- (E) Apesar de fazer parte da equipe multidisciplinar, a atuação fonoaudiológica com o paciente fissurado deverá acontecer apenas três meses após a cirurgia, pois antes disso não é possível observar o resultado anatomofuncional da reconstrução cirúrgica.

QUESTÃO 33

Uma paciente de dez anos de idade foi levada à clínica de fonoaudiologia para a realização de avaliação do processamento auditivo. No teste dicótico de dissílabos alternados (SSW), foram registrados os seguintes dados: DNC 1 DC 2 EC 15 ENC C. Na análise qualitativa dos erros, foram observadas seis inversões.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

- (A) Os resultados indicam, pela presença elevada de inversões, que a paciente apresenta dificuldades em memória para sons verbais em sequência.
- (B) Não foi observada a presença de padrão tipo A (indícios de dificuldades em associação som-símbolo).
- (C) Os resultados sugerem uma maior quantidade de erros na orelha direita que na orelha esquerda.
- (D) Os resultados indicam um efeito de ordem alto-baixo, indicativo de alteração de análise e síntese auditiva.
- (E) Os resultados indicam um efeito auditivo alto-baixo, indicativo de alteração de memória auditiva.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que apresenta a denominação da perda da capacidade de se usar a linguagem em decorrência de um dano cerebral.

- (A) disartria
- (B) afasia
- (C) transtorno fonológico
- (D) apraxia da fala
- (E) dislexia

QUESTÃO 35

No que se refere à prática da amamentação, assinale a alternativa correta.

- (A) A alternância de seios durante as mamadas oferece diferentes informações sensoriais ao bebê, pois a estimulação auditiva será diferente nas duas orelhas, auxiliando o desenvolvimento das habilidades auditivas. A orelha apoiada no colo poderá funcionar como um tampão monoaural para a outra orelha, que será treinada para separar os ruídos ambientais dos sons que chamam a atenção do bebê (fechamento auditivo e figura-fundo).
- (B) A sequência de Pierre Robin pode apresentar características como micrognatia (hipoplasia da mandíbula), glossoptose (queda da língua para trás) e fissura palatina em forma de “U”, entre outras que podem interferir no processo de amamentação. A glossoptose pode provocar dificuldades alimentares, pois a língua não tem força suficiente para se anteriorizar e abocanhar o bico do seio. Uma manobra conhecida para anteriorização da língua é a orientação quanto às posturas para se deitar o bebê, sendo a posição horizontal, em decúbito dorsal, a mais indicada.
- (C) A sequência de Moebius é uma paralisia congênita normalmente bilateral do nervo facial, por ausência total ou parcial do núcleo, e sua principal característica é a produção da face em máscara. Apesar de provocar pouca mobilidade de lábios, a maior parte dos bebês com essa patologia consegue ser amamentada em seio materno desde o nascimento, visto que não há comprometimento na mobilidade e no tônus da língua.
- (D) A técnica do copinho preconiza a oferta do leite materno por meio de um pequeno copo, com cuidado especial com o posicionamento do bebê e a quantidade ofertada. Essa técnica é indicada para os bebês com comprometimento respiratório, devido à menor quantidade de esforço para a alimentação, e nos casos de distúrbios neurológicos que afetam a movimentação da boca, da língua e das bochechas, visto que, por meio dela, não será necessária a extração do leite, apenas a deglutição.
- (E) Um dos fatores que favorecem o sucesso do aleitamento é a “pega” correta, que possibilita, por meio de uma adequada sucção, o esvaziamento dos seios lactíferos. Para tanto, é necessário que o bebê mantenha a cabeça e o tronco em linha reta, com a face voltada para o seio e o tronco voltado para cima. O queixo do bebê deve manter uma distância do seio para possibilitar a movimentação da mandíbula, o lábio inferior deve permanecer invertido e as bochechas devem ficar encovadas.

QUESTÃO 36

Após o nascimento, a nutrição do bebê acontece pela sucção, que estimula o padrão adequado de respiração nasal, o padrão neuromuscular ideal dos órgãos fonoarticulatórios, a postura correta e o aumento do tônus de todos os músculos envolvidos. A partir dessa informação, assinale a alternativa correta.

- (A) A sucção é um reflexo que está presente no recém-nascido até aproximadamente um ano de idade, sendo desencadeado com toques nos lábios.
- (B) A amamentação na primeira hora de vida é fundamental para que o processo se estabeleça e deve ocorrer em todos os recém-nascidos, inclusive nos prematuros extremos (28 semanas), visto que a coordenação entre sucção, deglutição e respiração é algo inato e encontra-se preservada em todos os recém-nascidos, independentemente da idade gestacional.
- (C) Os recém-nascidos apresentam o mesmo padrão de sucção (velocidade e pausas) para o estímulo de sucção nutritiva e não nutritiva.
- (D) A sucção de um recém-nascido a termo é caracterizada pela pressão intraoral negativa, exercida pelo bebê quando o leite se encontra na cavidade oral. É gerada pelo rebaixamento da mandíbula, pela depressão na porção medial do dorso da língua e pelo vedamento labial.
- (E) Para ser eficiente, a sucção necessita apenas da integração entre os lábios e a língua. Bochechas e palato mole não participam desse processo, que inclui a formação do bolo alimentar, seu posicionamento e sua ejeção, a fim de desencadear a deglutição.

QUESTÃO 37

O CAPE-V (*consensus auditory-perceptual evaluation of voice*), desenvolvido pela ASHA (*American Speech-Language-Hearing Association*) é uma ferramenta clínica e de pesquisa para promover a padronização, a avaliação e a documentação de julgamentos da qualidade vocal. Essa ferramenta analisa seis parâmetros vocais, dentre eles:

- (A) rouquidão; aspereza; e soproidade.
- (B) rugosidade; *pitch*; e *loudness*.
- (C) soproidade; astenia; e rouquidão.
- (D) aspereza; astenia; e rugosidade.
- (E) instabilidade; rouquidão; e tensão.

QUESTÃO 38

A afasia de Broca corresponde a uma lesão na área de Broca, isto é, na terceira circunvolução frontal esquerda. Geralmente, o quadro se instala rapidamente, quase sempre como consequência de um acidente vascular cerebral (AVC). Considerando essas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) O primeiro sintoma é a supressão total da fala, mas o mutismo irreversível é muito raro. Os problemas de grafismo também são muito comuns, uma vez que os pacientes quase sempre (80%) têm uma hemiplegia direita associada e devem escrever com a mão esquerda.
- (B) O discurso apresentado pelo paciente demonstra entonação variada e ritmo de fala mais rápido que o normal.
- (C) O diagnóstico desse tipo de afasia é feito por meio da associação entre o uso de jargão e um problema de compreensão e de repetição.
- (D) As consequências que poderão ser observadas no comportamento linguístico do paciente são: não compreender as mensagens orais; não repetir as palavras escutadas; não conseguir fazer um ditado; apresentar um problema discreto na expressão oral espontânea; e poder realizar leitura em voz alta.
- (E) Uma característica marcante é a diminuição geral da iniciativa. O paciente apresenta uma grande dificuldade para dar respostas imediatas à toda excitação vinda do exterior e demonstra ter dificuldade para planificar e iniciar seus atos, respondendo apenas ao estímulo máximo e à muita repetição, ainda assim com resposta tardia e mínima. A linguagem é bastante reduzida e as frases são curtas.

QUESTÃO 39

Diversas afecções neurológicas podem gerar distúrbios na deglutição, como traumas cranioencefálicos, doenças desmielinizantes ou neuromusculares, acidentes vasculares, entre outros. Cada doença apresenta características específicas, que geram sinais semelhantes nas estruturas do sistema estomatognático e podem ocasionar um distúrbio de deglutição. A avaliação clínica da deglutição pode ocorrer em dois momentos distintos de acometimento do quadro neurológico: em uma fase aguda (paciente à beira do leito) e em uma fase crônica (atendimento ambulatorial). A respeito do atendimento à beira do leito, assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação fonoaudiológica deverá ser realizada no momento da internação, visando ao melhor prognóstico do paciente, independentemente das condições clínicas.
- (B) A avaliação poderá ser feita inclusive em pacientes com escala de Glasgow abaixo de 8.
- (C) A presença da traqueostomia e o uso da ventilação mecânica não impossibilitam a avaliação, visto que sua utilização não interfere na elevação e na sensibilidade laríngea.
- (D) A presença de doenças contagiosas, como tuberculose, infecções por HIV e vírus de hepatite B ou C, impõe alguns cuidados diferenciados de biossegurança para proteger o paciente e os profissionais que o atendem diretamente.
- (E) A avaliação fonoaudiológica também deverá ser realizada em pacientes com intubação orotraqueal, visto que a presença do tubo não interferirá na mecânica da deglutição.

QUESTÃO 40

A avaliação do sistema vestibular é essencial para o tratamento de pacientes com disfunções do equilíbrio. Com relação à avaliação otoneurológica, assinale a alternativa correta.

- (A) O teste do impulso céfálico (HIT) consiste na observação dos olhos do paciente à medida que a cabeça é inesperadamente deslocada para baixo e para cima, com movimentos de alta velocidade. Esse teste só deve ser realizado nessa posição, pois ele é capaz de avaliar apenas o canal semicircular posterior.
- (B) A posturografia estática refere-se a um potencial eletromiográfico de curta latência evocado, em resposta a estímulos acústicos intensos.
- (C) O cVEMP (VEMP cervical) avalia a via vestibular descendente por meio do reflexo vestibulossacular ipsilateral e é responsável por manter a postura ereta por informações obtidas a partir do monitoramento sacular de posições e movimentos de cabeça.
- (D) A pesquisa do oVEMP (VEMP ocular) pode ser realizada tanto por via aérea quanto por via óssea. As frequências altas (faixa de 4.000 Hz), por via aérea, apresentam respostas mais amplas e mais efetivas.
- (E) A integração funcional das informações das estruturas sensoriais dos sistemas vestibular, sensorial e proprioceptivo nos núcleos vestibulares do tronco encefálico desencadeia reflexos oculares e espinais. O reflexo vestibulo-ocular (RVO) origina movimentos corporais compensatórios que mantêm a estabilidade da cabeça e do corpo, evitando quedas. O reflexo vestibulo-espinal (RVE) gera movimentos oculares que proporcionam uma visão clara enquanto a cabeça se movimenta.